

p. 90. — 8. *Polyalthia cerasoides* Benth. et Hook. — Laos : Nong-khay, Pak-lay et Luang-prabang, n° 3167 [*Thorel*].

p. 91. — 9. *P. evecta* Finet et Gagnep. — Laos : Stung-treng, Pak-lay, Vien-tian, Bassac, n°s 2119 et 2203 [*Thorel*].

p. 95. — 21. *P. Simiarum* Benth. et Hook. — Laos : La-khòn, Nong-khay, n° 3134 [*Thorel*].

p. 95. — 22. *P. Thorelii* Finet et Gagnep. — Cochinchine : Saïgon, n° 682 [*Thorel*].

p. 97. — 29. *P. debilis* Finet et Gagnep. — Laos : île du Khòn [*Thorel*].

p. 102. — 8. *Artabotrys Harmandii* Finet et Gagnep. — Laos : vallée du Mé-kong à Bassac, Stung-treng, Vien-tian, n° 2118 [*Thorel*].

p. 103. — 10. *A. intermedius* Hassk. — Cambodge : Angkor [*Thorel*]. — Laos : Nong-khay [*Thorel*].

p. 110. — 9. *Popowia diospyrifolia* Pierre. — Cochinchine, environs de Saïgon, n° 391 [*Thorel*]. — Cambodge : Angkor, n° 2086 [*Thorel*]. — Laos : Nong-khay, n° 3178 [*Thorel*].

*Obs.* — Quant au fruit, la diagnose latine peut être complétée ainsi : Pedicellus apice valde incrassatus; calyx persistens, sepala indurata. Carpella matura ovoidea, apice subumbonata, glabra, pisi magnitudine, pediculata, pediculus filiformis duplo longior; semen luteum, subglobosum, hilo inconspicuo.

p. 113. — 5. *Oxymitra fornicata* Hook et Th. — Cochinchine : Thu-dau-mot et Cai-cong [*Thorel*]. — Laos : Bassac [*Thorel*].

p. 117. — 5. *Goniothalamus saigonensis* Pierre. — Laos : Khong, Bassac, Stung-treng, n° 387 [*Thorel*].

p. 118. — 6. *G. tamirensis* Pierre. — Laos : Pou-nang, Stung-treng, n° 2487 [*Thorel*].

*Obs.* — Quant aux carpelles mûrs, la description spécifique peut être complétée ainsi :

Carpella matura longe ovoidea, subfusiformia, glabra, apice acuto-curvata, 15 mm. longa, 6 mm. lata, pediculo dimidio minore; semen unicum, rectum, apice mucronatum, basi insertum, linea meridiana, brunnea percursum.

p. 125. — 4 bis. *Mitrephora laotica*, sp. nov.

Arbor mediocris, erecta. Rami rigidi, annotini breves, glabri seniores longitudinaliter sulcati, nigrescentes vel cinerei, parce lenticellati. Folia alterna, dissita, petiolata, limbo oblongo, basi attenuato, apice abrupte et obtuse cuspidato, utrinque glabro, costa media supra demersa, infra valde prominente; nervi et nervuli obsoleti; petiolus glabrescens rugoso-plicatus, brevis, subteres, supra alte canaliculatus. Inflorescentia lateralis, e ramo seniore perbrevis, squamoso oriunda, 3-4-flora. Flos medioris, pedunculo squamoso, ciliato, fere obsoleto; pedicellus perianthium æquans, basi bracteis

oppositis duabus auctus, pilis brunneis, appressis tectus. Sepala 3, libera, erecta, *late ovata, apice obtusa*, extus puberula, intus glabra, marginibus ciliatis. Petala 6, intus et extus pubescentia, 3 exteriora libera, suberecta, lanceolata; 3 interiora in tecto globoso conniventia, exterioribus duplo breviora, obovato-acuta, basi nuda et late unguiculata. Stamina 3-4-serialia, omnia conformia, fere sessilia; loculi paralleli, dissiti, sublaterales vel potius extrorsi, rimis longitudinaliter dehiscentes; connectivum inter loculos latum, *ultra loculos subgloboso-expansum, papillosum*. Carpella 10 glabra (apud florem); ovarium subteres, apice paulo attenuatum, ad suturam ventralem sulcatum; stigma sessile, elongato-obpiriforme, ad ventrem sulcatum *parce papillosum*; ovula 8-10, biserialia. Fructus... Foliis limbus 18 cm. longus, 4-5 cm. latus; petiolus 8 mm. longus. Flos 8-9 mm. longus.

INDO-CHINE. — LAOS : Pak-lay, n° 3364 [Thorel].

Obs. — Cette espèce se rapproche du *M. Edwardsii* par le stigmatte allongé, à peine plus court que l'ovaire. Elle s'en distingue : 1° par ses feuilles non cordiformes, absolument glabres, non ovales; 2° par son inflorescence multiflore, non opposée aux feuilles; 3° par ses sépales non aigus; 4° par ses pétales intérieurs ne formant pas de dôme aigu; 5° par ses étamines papilleuses; 6° par ses carpelles glabres; 7° par son stigmatte fusiforme, épais. — PLANCHE III. Fig. D : 1, les 3 sépales; — 2, pétale ext. vu en dehors; — 3, le même en coupe; — 4, pét. int. vu en dedans; — 5, ensemble des 3 pét. int.; — 6, étam. vue de face; — 7, carpelle entier; — 8, ovaire en coupe longitudinale.

p. 125. — 5. *Mitrephora Thorelii* Pierre. — Cambodge : Angkor [Thorel]. — Laos : Compong-luong, Oudong, La-khôn, n° 3151; Xien-cang, Vien-tian, Pak-lay, n° 3233 [Thorel].

p. 128. — 1. *Xylopiya Vielana* Pierre. — Cambodge : Angkor, n° 2078 [Thorel]; Compong-thom [Gourgaud].

p. 131. — 1. *Melodorum Thorelii* Pierre. — Laos : La-khôn, Nong-khay, Bassac, n° 2674 [Thorel].

p. 134. — 2 bis. *Melodorum chrysosericeum*, nov. sp.

Frutex subscandens, 3-6 m. altus. Rami graciles, flexuosi, cernui, sulcato-reticulati, *juniores pilis sericeis et auratis, seniores albescentibus tecti*. Folia alterna, dissita, breviter petiolata, lanceolata, basi rotundata, apice sensim acuta, marginibus integris; *pagina superior glabra, excepta costa media dense tomentosa*; nervi paralleli, subrecti, conspicui, ad marginem evanescentes; *pagina inferior pilis simplicibus, densis, sericeis, appressis tecta*, nervis prominentibus, nervulis obsoletis; *petiolus sericeus, teres, brevis, obsolete canaliculatus*. Inflorescentia *uniflora, subterminalis, folio opposita, aureo-sericea*. Flos mediocris, sericeus, pedicello quam perianthium erectum paulo brevior; bractea ovata, pedicello paulo longior, supra glabra, infra sericea. Sepala 2, ovata, acuta, valvata, extus sericea, intus glabra. Petala 6, extus sericea, intus glabra, 3 exteriora oblonga, apice acuta, 3 interiora, triangularia, dimidio breviora. Stamina 4-5 serialia, extrorsa, omnia consimilia, cuneata; filamentum loratum, loculis duplo brevius; loculi elongati, rimis extrorsis longitudinaliter